



Allergies Alimentaires Canada

RÉACTIONS ALLERGIQUES

Pourriez-VOUS sauver une vie?

Une personne à risque d'anaphylaxie peut présenter n'importe lequel des symptômes suivants après avoir mangé ou s'être fait piquer par un insecte.

Pensez **VITE...**



Visage

Urticaire, démangeaisons, rougeur, enflure du visage, des lèvres ou de la langue

Respiration

Difficulté à respirer, à avaler ou à parler, congestion nasale, éternuements

Estomac

Douleurs, vomissements, diarrhée

L'ensemble du corps

Urticaire, démangeaisons, enflure, faiblesse, étourdissements, sentiment de détresse, perte de connaissance

Administrez de l'épinéphrine

- Administrez de l'épinéphrine (p. ex. EpiPen^{MD}, ALLERJECT[®]) au premier signe de réaction.
- Les premiers signes peuvent être bénins, mais les symptômes peuvent s'aggraver rapidement.
- Administrez de nouveau aussi rapidement que 5 minutes plus tard si les symptômes ne s'améliorent pas.

Appelez le 9-1-1

- Demandez que la personne soit transportée à l'hôpital le plus proche, même si les symptômes semblent légers ou disparus.

passer ensuite à **L'ACTION...**